

# රබර් ඉඩම්වල අන්තාසි වගා කිරීම

යූ. ඩී. ඩී. ගුණසිංහ විසින්  
(රබර් උපදේශක—ගම්පහ)

## හැඳින්වීම

මිහිරි රසයෙන් හා ගුණයෙන් පිරි හොඳ පළතුරු වර්ගයක් වශයෙන් අන්තාසි මෙරට මෙන්ම විදේශ රටවලද ජනප්‍රිය වී ඇත. විත්වල අසුරන ලද අන්තාසි කල්තබා ගැනීමට හැකි නිසා විදේශ වෙළඳ පොලටද යවා අප රටට විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් උපයා ගැනීමටද හැකිවී ඇත. මෑත භාගයේදී ශ්‍රී ලංකා අන්තාසි සඳහා එතෙරින් ලැබෙන ඉල්ලුම අධික නිසා ඊට සරිලන පරිදි අප රටේ අන්තාසි වගාව දියුණු කිරීම ප්‍රයෝජනවත් වේ. මෑතක් වනතුරු අන්තාසි අතුරු වගාවක් වශයෙන් පොල් ඉඩම්වල පමණක් වගා කරන ලද මුත් දැන් රබර් වගාකරන ඉඩම්වලද අන්තාසි අතුරු බෝගයක් වශයෙන් වගා කිරීමෙන්, අන්තාසි පසුරු සරුවට වැඩි හොඳ එලදවක් ලැබෙන බැව් පෙනී ගොස් ඇත.

නැවත වගා කරන හෝ අළුතෙන් රබර් වගා කරනු ලබන ඉඩම්වල අතිරේක බෝගයක් වශයෙන් අන්තාසි වගා කිරීමෙන් විශාල අමතර ආදායමක් ලබාගත හැක. පසුගිය අවුරුදු කීපය තුල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, ගම්පහ අවට රබර් ඉඩම් හිමියන් කීපදෙනෙකු රබර් සමග අන්තාසි වගාකර සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායතනය මගින් අත්හදා බැලීම් වශයෙන් කුඩා රබර් ඉඩම් හිමියන්ගේ අනුග්‍රහය ඇතිව ජාඇල, නිවන්දම වගා කරන ලද ඉඩම් වලින්ද මේ බව මනාව ඔප්පුවී ඇත.

අතිරේක වගාවක් වශයෙන් රබර් ඉඩම් වල අන්තාසි වගා කිරීමෙන් අවුරුදු 4 ක පමණ කාලයක් තුල හොඳ ආදායමක් ලබාගත හැකි වන අතර එයින් අත්වන ප්‍රයෝජන රැසකි. ඒවා නම් : පස සේදී යාම වැලකීම, වල් පැලෑටි මර්දනය, පසට ජලය උරා ගැනීම වැඩිවීම, දිරා යන අන්තාසි කොල සහ මුල් නිසා පසට ඵන්ද්‍රිය පොහොර එකතු වීමෙන් පස සාරවත් වීම, ආදියයි.

රබර් වගා කරනු ලබන ඉඩම්වල ආවරණ වැල් වගා කිරීම අනිවාර්ය මුත් අන්තාසි වගා කරන්නේ නම් ආවරණ වැල් වගා කිරීම අවශ්‍ය නොවනු ඇත.

අතිරේක වගාවක් වශයෙන්, රබර් ඉඩම්වල අන්තාසි වගා කිරීම සඳහා කොළඹ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, කුරුණෑගල සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයන්හි රබර් ඉඩම් හිමියනට රබර් පාලකගෙන් අවසර ලබාගත හැක.

## ඉඩම් සකස් කිරීම

ඉඩම් පිරිසිදු කිරීමෙන් පසු වෑක්ටරයක් මගින් හෝ පොලව කෙටීමෙන් හෝ පස හොඳින් බුරුල් කර ගත යුතුයි. ඉන්පසු පසෙහි වන පරණ මුල් සහ ගල් හැකි පමණ ඉවත් කොට වල ගොඩැලි සමතලා කළ යුතුයි. ඉඩම වටේ අඩි 2ක් පළල අඩි 1 ක් ගැඹුර කාණුවක් කැපීම ප්‍රයෝජනවත්ය.

## රබර් පැල සිටුවීම සඳහා වලවල් කැපීම

රබර් පැල සිටුවීම සඳහා සමතලා ඉඩමක නම් ජෙලි ක්‍රමයටත් බැවුම් සහිත ඉඩමක නම් සම මට්ටම් ක්‍රමයටත් අඩි 20 x 12 දුර ප්‍රමාණයට වලවල් කැපීම සුදුසුය. රබර් පැලවල වැඩිමට බාධා නොවන සේ අන්තාසි පැල, රබර් පැල වලට අඩි 4 ක් පමණ ඇතින් සිටුවිය යුතුය. මේ නිසා සමමට්ටම් ක්‍රමයට රබර් පැල සිටුවීම සඳහා වලවල් කැපීමේදී මොනායම් හේතුවක් නිසාවත් රබර් වලවල් ජෙලි අතර පරතරය අඩි 18 කට වඩා අඩු නොවිය යුතුය.

## අන්තාසි සිටුවීම සඳහා පොලව සකස් කිරීම

අන්තාසි සිටුවීම සඳහා අහල් 6 ක් පළල අහල් 6 ක් ගැඹුර සමමට්ටම් ක්‍රමයට රබර් පැල සිටුවීමට කැපු වලවල් ජෙලි අතර කාණු කැපිය යුතුයි. රබර් පැල ජෙලි අතර පරතරය අඩි 20 ක් වන විට ජෙලි දෙකක් අතර අන්තාසි ජෙලි තුනක් සිටුවිය හැක. පලමුවෙනි අන්තාසි

පෙල රබර් පැල සඳහා වූ වලවල් පෙලේ සිට අඩි 4 ක් ඇතින්ද, දෙවෙනි අන්තාසි පෙල පලවෙනි අන්තාසි පෙලේ සිට අඩි 6 ක් ඇතින්ද, තුන්වන අන්තාසි පෙල දෙවෙනි අන්තාසි පෙලේ සිට අඩි 6 ක් ඇතින්ද විය යුතුය. තුන්වන අන්තාසි පෙලේ සිට ඊළඟ රබර් පැල සිටුවීමේ වලවල් පෙලට අඩි හතරකින්ද විය යුතුය. (රූප සටහන).

### අන්තාසි වර්ග

අන්තාසි වර්ග කීපයක් ඇතත් “කිව්” සහ “මුරිසි” ජනප්‍රිය අන්තාසි වර්ග දෙකවේ. “කිව්” වර්ගයේ පත්‍රවල කටු නොමැත. ගෙඩි ප්‍රමාණයෙන් විශාලය. අධික යුෂ සහිත මෙම වර්ගය චින්චල ඇසිරීම සඳහා යෝග්‍ය වන අතර අලෙවි දෙපාර්තමේන්තුවේ ගබඩා වලට අලෙවි කළ හැක.

“මුරිසි” වර්ගයේ පත්‍ර කියුනු කටු වලින් යුක්තය. ගෙඩි “කිව්” වර්ගයේ ගෙඩි වලට වඩා කුඩාය. රසවත්ය. පලතුරු වර්ගයක් වශයෙන් මෙරට වෙළඳ පොලේ හොඳ මිලක් ලබා ගත හැක.

### අන්තාසි පැල තෝරා ගැනීම

අන්තාසි පැල තෝරා ගැනීමේදී රෝග වලට පාත්‍ර නොවූ ඉඩමකින් හැකි පමණ දුරට සම ප්‍රමාණයට වැඩුන නිරෝගී පැල තෝරා ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය. අක්කරයකට පැල 4000 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ.

### අන්තාසි පැල සිටුවිය යුතු කාලය

අධික වර්ෂාව ඇති කාලය හැරුණු විට අවුරුද්දේ ඕනෑම කාලයක අන්තාසි සිටුවිය හැක. අධික වර්ෂා කාලයේ අන්තාසි සිටුවීමෙන් ගොඩ කුණු වී මැරීයාමට ඉඩ ඇත.

රබර් පැල වලට අවුරුදු 4 ක් පමණ වන විට අතු බෙදී පොලවට සෙවන වැටෙන කාලයේ දී අන්තාසි ගස්වල වැඩීම දුර්වල වේ. එමනිසා රබර් පැල සිටුවීමට මාස 6 කට පමණ පෙර අන්තාසි සිටුවන්නේ නම් අන්තාසි වගාවෙන් වැඩි කාලයක් ආදායම් ලබා ගත හැකි වනු ඇත.


### අන්තාසි පැල සිටුවීම

- අන්තාසි වගාවට පිටි මකුණාගෙන් බෝවන අන්තාසි පදුරු මැලවියාමේ රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා සිටුවීමට පෙර අන්තාසි පැල රෝග බීජ නාශකයක ගිල්වා සිටුවිය යුතුය. මේ සඳහා “සුමනියොන්” දියර අවුන්සයක් වතුර ගැලුම් 6 කට මිශ්‍රකර අන්තාසි පැල සම්පූර්ණයෙන් ගිල්විය හැකි වන පරිදි එම මිශ්‍රණය ලොකු බැරලයකට සාදගන්න. වරකට පැල 5 ක් පමණ පත්‍ර පහතට සිටින මස් අල්ලා, මිශ්‍රණයේ ගිල්වා, මද වේලාවක් තබා ඉවතට ගෙන සතියක් පමණ සෙවන තැනක තබන්න. රෝග බීජ නාශක මිනිස් ශරීරයටද විෂ සහිත බැවින් පැල ඇල්ලීමේදී ආරක්ෂාව සලසාගත යුතුය.

ලොකු පැල සහ කුඩා පැල එක ලඟ සිටුවීමෙන් කුඩා පැලවල වැඩීම දුර්වල වේ. මේ නිසා අන්තාසි පැල ලොකු, මධ්‍යම සහ කුඩා යනුවෙන් කොටස් තුනකට වර්ග කරගත යුතුය.

කලින් පිළියෙල කරගත් කාණුවල, පැල අතර පරතරය අහල් 18 ක් වන සේ, වර්ගකරගත් අන්තාසි පැල ඉඩමේ වෙන් වශයෙන් සිටුවිය යුතුය. බැවුම සහිත ඉඩමක නම් අන්තාසි පැල බැවුම පැත්තට මඳක් ඇලවනසේ තබා සිටුවීම මැනවි.

අන්තාසි පැල අතරට කොහුවක් දමන්නේ නම් වල් පැලෑටි වැඩීමක් ඇති නොවන අතර පොලවේ තෙතමනය රඳා පවතී. එහෙත් මේ සඳහා විශාල වියදමක් දැරීමට සිදුවන අතර අධික වර්ෂාව ඇති ප්‍රදේශවල මේ නිසා අන්තාසි වගාවන්ට ගස් මැලවී යාමේ රෝගය හට ගැනීමට ඉඩ ඇත.



## පස් සංරක්ෂණ ක්‍රම සැලසීම

සාමාන්‍ය බැවුම් සහිත හෝ සමතලා ඉඩමක නම් අන්තාසි වගාව කරන තුරු පස් සංරක්ෂණ ක්‍රම අවශ්‍ය නොවේ. එහෙත් තද බැවුම් සහිත ඉඩමක නම් අන්තාසි සහ රබර් සිටුවීමට කලින් කාණු හෝ ගල් වැටි කීපයක් දැමිය යුතුය. අන්තාසි වගාව ඉවත් කල පසුද ක්‍රමවත්ව කාණු හෝ ගල් වැටි දැමීමට වගබලා ගත යුතුය.

### අන්තාසි වගාවට පෝර යෙදීම

අන්තාසි පැල සිටුවා මාස 3 කට පසු අක්කරයකට N:P:K—4:8:5 පෝර හොණ්ඩර 15 ක් (පැලයකට අවුන්ස 6 ක් පමණ) යෙදිය යුතුය. අන්තාසි පැල පේලි දිගේ එක පැන්තකට පමණක් වැටෙන සේ මුල් අසලට පෝර ඉස අහල් 2 ක් පමණ ගැඹුරට පස සමග මිශ්‍ර කරන්න. මෙසේ කිරීමේදී පැලවල මුල් තදින් ඇවිස්සීමට ඉඩ නොතැබිය යුතුය.

අන්තාසි පැල සිටුවා 7 වෙනි මාසයේදී ද එම පෝර මිශ්‍රණයෙන් හොණ්ඩර 15 ක් පෙර දැමූ පරිදීම අන්තාසි පේලි දිගේ අනික් පැන්තට දමා පස සමග මිශ්‍ර කරන්න.

අන්තාසි පැල සිටුවා 9 වෙනි මාසයේ දී ද එම පෝර මිශ්‍රණයෙන් හොණ්ඩර 15 ක් පෙර පරිදීම අන්තාසි පැල පේලි දිගේ පලමු වර දැමූ පැන්තට දමා පස සමග මිශ්‍ර කරන්න.

දෙවෙනි අවුරුද්දේ සිට ගෙඩි කඩා සති 6 කට පසු අක්කරයකට පෝර හොණ්ඩර 20 බැගින් පැති මාරුකර ගස් මුලට දමා පස සමග මිශ්‍ර කරන්න. අවුරුද්දකට දෙවරක් ගෙඩි කඩා ගත හැකි බැවින් අවුරුද්දකට දෙවරක් පෝර දැමිය යුතුය.

### අන්තාසි වගාවේ මල් හටගන්වා ගැනීම

හොඳින් වැඩුනු සෑම අන්තාසි භසකම එකම කාලයේදී එල හට ගන්වා ගන්නේ නම් සතුන් ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, පහසුවෙන් අලෙවිකර ගැනීමටත් හැකි වන අතර, අවාරයේදී ලබන ගෙඩි වලින් උපරිම ලාභයක් ලබා ගැනීමටත් හැකි වෙනවා ඇත.

අන්තාසි පැල සිටුවා 9 වෙනි මාසයේදී පමණ සමපූර්ණයෙන් වැඩුනු කොළ 30 ක් පමණ තිබේ නම්, කෘත්‍රීම ක්‍රමයට මල් හට ගන්වා එකම කාලයේදී ගෙඩි කඩා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රම පාවිච්චි කළ හැක.

“කිව්” වර්ගයට: “ඇසිටිලින්” වායුව අඩංගු දියරයක් යෙදීමෙන් “කිව්” වර්ගයේ අන්තාසි ගස් වලින් එල හට ගන්වා ගත හැක. මේ සඳහා පහසුම ක්‍රමය නම් “කාබයිඩ්” අවුන්ස 6 ක් වතුර ගැලුම් 4 කට මිශ්‍රකර එම මිශ්‍රණයෙන් අඩු කෝප්පයකින් 1/3 ක් පමණ මිශ්‍රණය පිළියෙල කරගත් විගසම හොඳින් වැඩි ඇති ගස්වල කරටිය (ගොබය) තුලට වත් කිරීමයි. පැය 48 ක පමණ කාලයක් ගතවන තුරු වර්ෂාව නොතිබිය යුතුය. සති 6—8 කට පසු මල් හට ගනු ඇත. මාස 5 කින් පමණ ගෙඩි හොඳින් පැසෙයි.

“මුරිසි” වර්ගයට: “ඇල්පා—නැප්තලින් ඇසිටික් අම්ලය” අඩංගු “පෙල්ස්ටෝන්” — p—(Shellestone-p-) අවුන්ස 1 ක් වතුර ගැලුම් 12 කට මිශ්‍රකර එයින් අවුන්ස 2—2½ බැගින් හොඳින් වැඩි ඇති ගස්වල කරටිය (ගොබය) තුලට වත් කරන්න. පැය 48 ක් පමණ ගත වන තුරු වර්ෂාව නොතිබිය යුතුය. සති 6—8 කට පසු මල් හට ගනු ඇත. මාස 5 කින් පමණ ගෙඩි හොඳින් පැසෙයි.

ගෙඩිවල බර වැඩිකර ගැනීමට “පෙල්ස්ටෝන්”—p—(Shellestone-p-) අවුන්ස 4 ක් වතුර ගැලුම් 5 කට මිශ්‍ර කර ගෙඩිය පැසෙයි සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වන දිනට සති 8—9 කට කලින් ගෙඩි වලට ඉසින්න. මෙම දියර වැඩෙන පැල වලට වැටෙන්නට ඉඩ නොතබන්න.

## අන්තාසි ගෙඩි කැඩීම

පැසුණු අන්තාසි ගෙඩි කැඩීමේදී ටීට් දිග මුවහත් කැත්තක් වැනි ආයුධයකින් ගෙඩියේ නටුව ගසට සම්බන්ධ වූ ස්ථානයෙන්ම කපාගත යුතුය. ගෙඩියේ නටුව ගසට ඉතිරි වන සේ කපා ගතහොත් පසුව හැදෙන මොරෙයින් (පැල) ගසේ ඉහලින් සෑදී ගෙඩි හැදුන විට ගස් කඩා වැටෙන්නට ඉඩ ඇත.

ගෙඩි කඩාගත් පසු ගොදිත් වැඩුන මොරෙයින් 2-3 ගසට ඉතිරිවන්නට හැර වැඩි ඒවා කැඩිය යුතුයි. දෙවැනි අවුරුද්දේ සිට අන්තාසි මොරෙයින් විකිණිය හැක.

## අන්තාසි වගාවට ඇතිවිය හැකි රෝග

අන්තාසි වගාවන්ට වැළඳෙන හයානකම රෝගය නම අන්තාසි පදුරු මැලච්චේ රෝගයයි. මෙය පිටි චක්කණ වීසින් අන්තාසි ගස් වලට විදිනු ලබන චෙවරයකින් හට ගන්නා අතර කුහුඹුවන් වීසින් නිරෝගී ගස් වලටද එය පතුරුවා හරිනු ලබයි.

මෙම රෝගය වැළඳුන විට අන්තාසි කොළ දුඹුරු පැහැයක් ගෙන පසුව කහ පැහැයකට හැරී ගස් කඩා වැටී මුළුමනින්ම වියලී යයි.

අන්තාසි වගාවේ පිටි මකුණන් සිටින බවට ලකුණු පහල වූ විගස "සුළුතියොත්" දියර අඩුත්ස 1 ක් වතුර ගැලුම 4 කට මිශ්‍රකර ගස් සමපූර්ණයෙන් නෙලියන සේ ඉසිලෙන් "පිටි චක්කණ" සහ කුහුඹුවන් සාර්ථක ලෙස මර්දනය කල හැක.

## අන්තාසි වගාවට හානිකරවූ වෙනත් සතුන්

කපුටන්, ලේනුන් හා වෙනත් එවැනි සතුන් අන්තාසි ගෙඩි වලට හානි කරන අතර එවැනි සතුන් බිය ගන්වා පලවා හැරීමෙන් හෝ අන්තාසි ගෙඩි ගසේ කොලවලින් ආවරණය කර බැඳීමෙන් ගෝ පිදුරු වලින් ආවරණය කිරීමෙන් හෝ ආරක්ෂා කරගත හැක.

## අන්තාසි වගාවේ ආර්ථික පක්ෂය

රබර් වගා කරනු ලබන ඉඩම වල අතිරේක වගාවක් වශයෙන් අන්තාසි වගා කිරීම සඳහා අක්කරයකට රුපියල් 1,500 ක පමණ මූලික වියදමක්ද, පළමු අන්තාසි අස්වැන්න නෙලා ගන්නා කාලය දක්වා වලට පැලෑටි මර්දනයට සහ පෝර යෙදීමට රුපියල් 1,700 ක පමණ වියදමක්ද දැරිය යුතුය. එහෙත් 14 වෙනි මාසයේදී පමණ නෙලාගත හැකි පළමු අන්තාසි අස්වැන්නෙන් සියළුම වියදම් පියවා රුපියල් 500 ක පමණ ශුද්ධ ලාභයක් ලබාගත හැක.

හදවන අවුරුද්දේ සිට අවුරුද්දකට දෙවරක් අස්වනු නෙලාගත හැකි වන අතර උපායමයින් විකිණීමෙන්ද අමතර ආදායමක් ලබා ගත හැක.

මේ අනුව අන්තාසි වගා කර අවුරුදු 4 ක පමණ කාලයක් තුල රුපියල් 10,000 පමණ ශුද්ධ ආදායමක් ලබා ගත හැක.

පරණ රබර් ගස් උදුරා දැමීමෙන් පසු අළුත් රබර් වගාවේ ආදායම ලබා ගන්නා කාලය එළඹෙන තෙක් නොලැබී යන ආදායම අළුත් රබර් වගාවක් සමග අන්තාසි වගා කිරීමෙන් ලබාගත හැකි බැව් මෙයින් පැහැදිලි වේ.