


කොළ පැහැති ආකුර බද්ධ පැල මගින් රබර් පැලයේ ලාබාල කාලය අඩු කිරීම

කුකුලන් ඇතිකිරීම සහ රබර් වගාව

කුකුලන් ඇති කිරීමෙන් රබර් කිරි ඵලදාව වැඩිකර ගැනීමට හැකි බව පර්යේෂණ මගින් සොයා ගෙන ඇත. මේ අනුව රබර් වතු වල කුකුලන් ඇතිකිරීමෙන්, රබර් වගා කරුවන්ට ප්‍රයෝජනවත් වාසි කිහිපයක්ම ලබාගත හැකිය. එනම් අවුරුදු 1½ කින් පමණ රබර් ගසෙහි ලාබාල කාලය කෙටිකර ගත හැකි වන අතර වල් පැලෑටි ඉවත් වීමට දැඩිම සහ පස සාරවත් කර ගැනීමටද උපකාර වෙයි.



පොලිතින් මලුවල සිටුවන ලද කොළ පැහැති ආකුර බද්ධ පැල මගින් රබර් පැලයේ ලාබාල කාලය අඩු කිරීම

රබර් කම්පෝනියට මුහුණ පෑමට ඇති බරපතල අඩුපාඩුවක් වනුයේ බද්ධ පැල වලින් කිරි ලබාගැනීමට අවුරුදු 7 ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි වූ දීර්ඝ කාලයක් ගතවීමයි. නිෂ්පාදනයක් සිදු නොකෙරෙන මෙම කාලය අඩු කිරීමට නොයෙකුත් ක්‍රම මගින් උත්සාහ දරා ඇත. අපේ කෘෂිදේශගුණික තත්වයන් යටතේ මෙම අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට කොළ පැහැති ආකුර බද්ධ කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගැන නොයෙකුත් මත ඉදිරිපත් වී ඇත. මේ ක්‍රමය යොදා ගැනීමෙන් දුඹුරු පැහැති ආකුර බද්ධ කිරීමෙන් ලබාගන්නා පැලවලට වඩා අවුරුද්දක් අඩු කාලයකදී රබර් ගස්වලින් කිරි ලබාගැනීමට හැකි බව ඔප්පු වී ඇත.


පර්යේෂණයේදී 60X30 සෙ. මී. සහ 300 ක සණකම් ඇති පොලිතින් මලු, වත්තේ මතුපිට ඇති හොඳ පසින් පුරවා ඒවායේ ග්‍රාහක පැල (Stock Plants) විවකු ලැබේ. මෙම බීජ පැල වලට මාස 5 ක් පමණ වන විට කොළ පැහැති ආකුර එයට බද්ධ කරයි. මාස 5 ක් පමණ කාලයක් වන විට එනම් පැල සිටුවන කාලය වන විට අනුජ (Scion) සෙ.මී. 60 - 70 පමණ උසට වැඩි කොළ වට දෙකකින් හෝ තුනකින් පමණ යුක්ත වේ. අග කොළ මේරූ පැල වත්තේ නැවත සිටුවනු ලැබේ. මින්පසු නිරීක්ෂණය සඳහා දුඹුරු ආකුර බද්ධ කරන ලද පැලද මේ සමග සිටුවනු ලැබේ.

පැල සිටුවා පලමු අවුරුද්ද ඇතුළතම කොළ පැහැති ආකුර බද්ධ කරන ලද පැල දුඹුරු පැහැති ආකුර බද්ධ කරන ලද පැල

වලට වඩා සීඝ්‍රයෙන් වැඩෙනු පෙනුණි. එමෙන්ම එම කොළ පැහැති අංකුර බද්ධ කරන ලද පැල කිරි කැපීමේ අවදියට, අවුරුද්දකට කළින් එළඹෙනු දකින්නට විය කිරි කැපීමේ අවදියට එළඹුණු නැති ගස් ප්‍රමාණයද සසාදු විට ඉතා අඩු ප්‍රමාණයක් විය.

කුඩා රබර් වතු වවන්නන්ට ලාභදයක අතුරු හෝගයක් ලෙස කෙසෙල්

දැනට කර ඇති පර්යේෂණ අනුව තෝරාගන්නා ලද ක්ලෝනයේ බද්ධ පැල මී 5x5 පරතරයක් ඇතිව පැල කරනු ලැබේ. ඉන් මාස 6 කට පසු මෙහිම, කෙසෙල් පැල අතර, මී 5x2 පරතරයක් ඇතිවන ලෙස, රබර් පැල ජෙලි දෙකක් අතරට කෙසෙල් ජෙලියක් වැටෙන සේ මාරුවෙන් මාරුවට කෙසෙල් අංකුර (මොට්) සිටුවිය යුතුය.



පර්යේෂණ අනුව කෙසෙල් අංකුර සිටුවා මාස 4 කට පසු, මාස 6 ක් අතර කාලය තුළදී මසකට වරක් 8:8:16 NPK මිශ්‍රණයේ ග්‍රෑම් 800 ක් පැලයකට වැටෙන සේ පොහොයා යෙදිය යුතුය. මේ අතර පස් නොගැඹුරු ගලස කෙටීමෙන්ද, වියලී ගිය අතු ගස මුල දිරාපත් වීමට ඉඩ හැරීමෙන්ද, පැලවලට කරා යෙදීම ආදී සාමාන්‍ය ක්‍රියා පිළිවෙලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අනුමාණය කල යුතුය. අවුරුද්දක් ආරම්භයේදී කෙසෙල් අංකුර සිටුවනු ලැබුයේ නමුත් වසරේ සිට මාස 2 ක් පමණ කාලයක් වනතෙක් කෙසෙල් කැන් නෙලීම කල හැකිය.

රබර් සිටුවීම සිදු කරන අවුරුද්ද තුළ රනිල ආවරණ වගාවක් සිටුවීමටද මෙම කෙසෙල් වගා කිරීමේ ක්‍රියා වලියෙන් බාධාවක් සිදු නොවේ. එමනිසා රබර් වවන්නන්ට අතුරු බෝගය සහ ආවරණ වගාව යන දෙකෙන්ම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට හැකිවේ.

රබර් ලිය විදේශ විනිමය ලබාගැනීමේ ක්‍රමයක් ලෙස

රබර් ලියේ අගතා භාවය (Versatility) බොහෝ දෙනෙකු නොදන්නකි. මෙම මෘදු ලිය නොයෙකුත් මාදිලියේ ගෘහ භාණ්ඩ සාදා ගැනීම සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගත හැකිය. මෙම ලිය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට පෙර පෝරනුවක දමා වේලා ගත යුතුය. මින්පසු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුඩා කොට ඒ ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අනුව වෙන් කරනු ලැබේ. කෘමි සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට කෘමි නාශක ආලේපයක් ගල්වා ගනු ලැබීමෙන් පසු තමන්ට අවශ්‍ය භාණ්ඩ සාදා ගැනීමට ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි මෙන්ම විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමට හැකි අගතා මාධ්‍යයක් ලෙසද මෙය පෙන්වුම් කළ හැකිය.